

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI  
GRÖBNER BASES IN COMBINATORICS  
(Gröbner–bázisok a kombinatorikában)

HEGEDŰS GÁBOR

BUDAPEST  
2005

# 1. Bevezetés

Legyen  $\mathbb{F}$  egy test. Ebben a munkában véges  $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{F}^n$  ponthalmazokon értelmezett polinomfüggvényeket vizsgálunk. A  $\mathcal{V}$ -ból  $\mathbb{F}$ -be képező polinomfüggvények kódolják a  $\mathcal{V}$  kombinatorikai és geometriai tulajdonságait. Ahhoz, hogy jobban megérthessük ezeket a függvényeket, bevezetjük a  $\mathcal{V}$  ponthalmazhoz tartozó ideált:

$$I(\mathcal{V}) := \{f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n] : f(v) = 0 \text{ minden } v \in \mathcal{V}\text{-re}\}.$$

Az  $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomgyűrű ideáljaihoz fontos speciális generátorrendszerek is tartoznak, amelyeket Gröbner–bázisoknak mondunk. A munkánk egyik alapvető célja az volt, hogy leírunk bizonyos kombinatorikai jellegű ponthalmazok ideáljaihoz tartozó Gröbner–bázisokat és a hozzá kapcsolódó struktúrákat (elsősorban a standard monomokat és a Hilbert függvényt). Olyan kombinatorikai alkalmazásokat is bemutatunk, amelyek mutatják ennek a megközelítésnek a hatékonyságát.

## 1.1. Összefoglaló a Gröbner–bázisok elméletéről

A következőkben röviden értelmezzük a Gröbner–bázis és a standard monom fogalmát. Először bevezetünk néhány jelölést. Jelölje  $S := \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  az  $x_1, \dots, x_n$  változók polinomgyűrűjét az  $\mathbb{F}$  test felett. Legyen  $\text{Mon}(n, d)$  az összes  $d$  fokú  $x^u \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  monom halmaza és

$$\text{Mon}(n, \leq d) := \bigcup_{i=0}^d \text{Mon}(n, i)$$

a legfeljebb  $d$  fokúaké. Ha  $J \subseteq [n]$ , akkor legyen  $x^J := \prod_{j \in J} (x_j - 1)$ , míg  $x_J := \prod_{j \in J} x_j$ . Speciálisan  $x^\emptyset = x_\emptyset = 1$ .

Egy  $\prec$  lineáris rendezést az  $x_1, \dots, x_m$  változókból felépített monomokon *tagrendezésnek* mondunk, ha 1 a minimális elem a  $\prec$ -re nézve és ha  $u \prec v$ , akkor  $uw \prec vw$  teljesül minden  $w$  monomra. Értelmezünk két fontos tagrendezést: a  $\prec_{lex}$  lexikografikus rendezést és a  $\prec_{deg}$  deglex rendezést. Legyen  $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_m^{i_m}$  és  $x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_m^{j_m}$  két tetszőleges monom. Ekkor

$$x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_m^{i_m} \prec_{lex} x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_m^{j_m}$$

pontosan akkor, ha  $i_k < j_k$  teljesül a legkisebb olyan  $k$  indexre, amelyre  $i_k \neq j_k$ .

A deglex rendezést hasonlóan értelmezzük:  $u \prec_{deg} v$  pontosan akkor, ha  $\deg u < \deg v$ , vagy  $\deg u = \deg v$  és  $u \prec_{lex} v$ .

Egy  $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinom  $\text{lm}(f)$  főmonomja egy  $\prec$  rögzített tagrendezésre nézve a legnagyobb olyan monom, amelyik megjelenik  $f$ -ben nem

nulla együtthatóval, ha  $f$ -et a kanonikus módon felírjuk monomok  $\mathbb{F}$ -lineáris kombinációjaként.

Most bevezetjük a Gröbner–bázis fogalmát. Egy  $I \neq (0)$  ideál  $\text{in}(I)$  kezdőideálja az az ideál, amelyet az  $I$ -beli polinomok főmonomjai generálnak. Egy  $\mathcal{G} = \{g_1, \dots, g_t\} \subseteq I$  véges polinomhalmazt az  $I$  ideál *Gröbner–bázisának* nevezünk, ha a polinomok  $\text{lm}(g_1), \dots, \text{lm}(g_t)$  főmonomjai generálják az  $\text{in}(I)$  kezdőideált. Könnyű belátni, hogy tetszőleges Gröbner–bázis az  $I$  ideál bázisa is egyúttal.

Az  $I \subseteq \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  ideál egy  $\{g_1, \dots, g_t\}$  Gröbner bázisát *redukáltnak* mondjuk, ha minden  $\text{lm}(g_i)$  főmonom együtthatója az  $g_i$  polinomban 1, és egyetlen  $g_i$ -beli nem nulla monom sem osztható bármely másik  $\text{lm}(g_j)$ ,  $j \neq i$  főmonommal. Buchberger egyik tétele ([1, Theorem 1.8.7]) szerint bármely  $\prec$  tagrendezésre nézve az  $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomgyűrű tetszőleges nem nulla ideáljának egyértelműen létezik redukált Gröbner–bázisa.

Legyen  $\prec$  egy fix tagrendezés a monomokon. Egy  $w \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  monomot az  $I$  ideál *standard monomjának* mondunk, ha  $w \notin \text{in}(I)$ , azaz  $w$  egyetlen  $f \in I$  polinomnak sem a főmonomja. Jelöljük  $\text{Sm}(\prec, I)$ -vel az  $I$  ideál standard monomjainak a halmazát a  $\prec$  tagrendezésre nézve.

Végül bevezetjük az affin Hilbert függvény fogalmát. Legyen  $I := I(\mathcal{V})$  egy  $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{F}^n$  véges ponthalmaz ideálja. Ekkor jelölje  $h_I(m)$  azoknak a  $\mathcal{V}$ -ból  $\mathbb{F}$ -be képező függvények terének az  $\mathbb{F}$  test feletti dimenzióját, amelyeket felírhatunk mint egy legfeljebb  $m$  fokú polinomot. Ekkor  $h_I : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  az  $I = I(\mathcal{V})$  ideál Hilbert függvénye.

A kombinatorikai szakirodalomban ezt a fogalmat a tartalmazási mátrixokkal ragadják meg. Legyen  $\mathcal{F}$  és  $\mathcal{G} \subseteq 2^{[n]}$  két tetszőleges halmazrendszer. Ekkor az  $I(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  tartalmazási mátrix egy olyan  $|\mathcal{F}| \times |\mathcal{G}|$  méretű  $(0, 1)$  mátrix, amelynek a sorait  $\mathcal{F}$ -rel, míg az oszlopait  $\mathcal{G}$ -vel indexeljük. Az  $(F, G)$  párnak megfelelő helyen 1 áll a mátrixban, ha  $G \subseteq F$ , és 0 egyébként (itt  $F \in \mathcal{F}, G \in \mathcal{G}$ ).

## 1.2. Történeti előzmények

A Gröbner–bázisok elméletének érdekes a történeti háttere. A fogalom előképe már Macaulay polinomgyűrűkről szóló munkáiban is megjelent. Először H. Hironaka vezette be a Gröbner–bázisokat a 60-as években. Ő a többváltozós polinomok redukciós algoritmusát a szingularitások feloldásáról szóló alapvető cikkében használta fel. Később B. Buchberger fedezte fel a Gröbner–bázisokat újra, majd leírta őket a doktori értekezésében. Buchberger használta először a Gröbner–bázis elnevezést, a témavezetőjének, W. Gröbnernek a tiszteletére. Buchberger értekezése egyúttal tartalmazza a Buchberger–kritériumot és a nevezetes Buchberger–algoritmust is implicit formában.

A lineáris algebrai módszer az eredményeink másik fő forrása. Ez a módszer sokféle kombinatorikai struktúra méretére ad felső korlátokat. Általánosan fogalmazva, ezen a következőket értjük. Jelöljön  $\mathcal{F}$  egy kombinatorikai jellegű véges ponthalmazt az  $\mathbb{F}^n$  affin térben. Tegyük fel, hogy minden  $v \in \mathcal{F}$  vektorra értelmezhetünk egy  $p_v(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomot oly módon, hogy a  $\{p_v : v \in \mathcal{F}\}$  polinomok lineárisan függetlenek lesznek az  $\mathbb{F}$  felett. Jelöljük  $\mathcal{T}$ -vel a  $p_v$  polinomokban szereplő monomok halmazát. Ekkor a lineáris algebra korlát módszer az  $|\mathcal{F}| \leq |\mathcal{T}|$  felső becsléshez vezet.

Ezt az egyszerű módszert kötöttük össze a Gröbner–bázisok redukciójával. Tegyük fel, hogy az  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$  valamely rögzített  $\mathcal{G} \subseteq \mathbb{F}^n$  véges ponthalmazra. Bizonyos esetekben a  $\mathcal{T}$  választható az  $\text{Sm}(I(\mathcal{G}), \prec)$  részhalmazának, ahol  $\mathcal{G}$  egy jól kezelhető ponthalmaz abban az értelemben, hogy elég sok információ van a standard monomjairól. Ekkor a korábbiaknál élesebb korlát nyerhető  $|\mathcal{F}|$ -re. Erre a változatra példa Babai és Frankl egy sejtésére talált megoldásunk.

Az eredményeink előzményei között feltétlenül meg kell említenünk R. Smolensky Boole függvényekről szóló munkáját. A [17] cikkben gyümölcsöző összefüggéseket talált a Boole függvények bonyolultságelmélete és a Gröbner–bázisok elmélete között. Smolensky a következő megközelítéssel élt.

Az  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$   $n$  változós Boole függvényt reprezentálhatjuk olyan  $g(x_1, \dots, x_n)$  valós többváltozós polinommal, amelynek a zéróhalmaza ugyanaz, mint az  $f$  és az  $x_i^2 - x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$  polinomok együttes nullhelyei.

Tekintsük azt a véges ponthalmazt, amelyet a  $g = 0$  és az  $x_i^2 - x_i = 0$ ,  $i = 1, \dots, n$  egyenletek értelmeznek. Ekkor megvizsgálhatjuk az ehhez a ponthalmazhoz tartozó ideál affin Hilbert függvényét. Smolensky megmutatta a [17] cikkben, hogy ennek a Hilbert függvénynek az értékei közvetlenül kapcsolódnak bizonyos bonyolultságelméleti alsó korlátokhoz.

Végül legyen  $0 \leq d_1 < \dots < d_t \leq n$  nemnegatív egészek szigorúan monoton növő sorozata. Jelölje

$$\mathcal{F} := \binom{[n]}{d_1} \cup \dots \cup \binom{[n]}{d_t}$$

a  $\{0, 1\}^n$  Boole–kocka egy szimmetrikus részhalmazát, azaz az  $\binom{[n]}{d_i}$  teljes uniform családok unióját. Nyilván  $V(\mathcal{F})$ , az  $\mathcal{F}$  karakteristikus vektorainak a halmaza egy megfelelő szimmetrikus Boole–függvény zéróhalmaza. A [3] cikkben Bernasconi és Egidi teljesen meghatározta a szimmetrikus Boole–függvények zéróhalmazaihoz rendelt ideálok Hilbert függvényét  $\mathbb{Q}$  felett. Ennek a leírásnak a segítségével elemeztek a többségi függvény viselkedését a Boole–kocka szimmetrikus részhalmazain.

## 2. Az értekezés eredményei

### 2.1. A teljes $\ell$ -széles és a teljes $d$ -uniform halmazrendszerek vizsgálata

Először értelmezzük az  $\ell$ -széles családokat.

Legyen  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  egy tetszőleges halmazrendszer. Jelölje  $v_F \in \{0, 1\}^n$  az  $F \subseteq [n]$  halmaz karakterisztikus vektorát. Ekkor

$$V(\mathcal{F}) := \{v_F : F \in \mathcal{F}\} \subseteq \{0, 1\}^n \subseteq \mathbb{F}^n$$

az  $\mathcal{F}$  halmazrendszer karakterisztikus vektorainak a halmaza.

Jelölje

$$\mathcal{F}^{k, \ell} = \{F \subseteq [n] : k - \ell < |F| \leq k\}$$

a teljes  $\ell$ -széles családot. Egy  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  halmazrendszeret  $\ell$ -szélesnek mondunk, ha  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}^{k, \ell}$  egy megfelelő  $k$ -ra.

A disszertáció 3. és 4. fejezetében leírjuk a teljes  $d$ -uniform és a teljes  $\ell$ -széles családok karakterisztikus vektoraihoz tartozó ideál redukált Gröbner-bázisát és a kezdőideálok minimális generátorrendszerét. Ezt az eredményt az  $\mathcal{F}^{k, \ell}$  családhoz kapcsolódó tartalmazási mátrixok rangjának meghatározására alkalmazzuk. Bebizonyítjuk egyúttal Frankl egyik sejtésének a speciális esetét is, amely azon maximális halmazrendszer méretére kérdez rá, amelyhez nem létezik  $t$  elemű szétzúzott halmaz, és amely nem tartalmaz  $\ell + 1$  elemű láncot.

A most következő definíciókban bevezetjük a teljes  $\ell$ -széles családokhoz tartozó ideál redukált Gröbner-bázisaiban szereplő polinomokat.

Legyenek  $\ell$  és  $t$  pozitív egészek. Jelölje  $\mathcal{H}(t, \ell)$  az  $[n]$  azon  $H = \{s_1 < \dots < s_t\}$  részhalmazainak a halmazát, amelyekre  $t$  a legkisebb olyan  $j$  index, amelyre  $s_j < 2j - \ell + 1$  teljesül. Az  $\ell = 1$  speciális esetben legyen  $\mathcal{H}(t) := \mathcal{H}(t, 1)$ , ha  $t \geq 1$ .

Megjegyezzük, hogy a  $\mathcal{H}(t, \ell) = \emptyset$  ha  $t < \ell$ . A  $\mathcal{H}(t, \ell)$  elemei az  $[n]$   $t$  elemű részhalmazai és  $H \in \mathcal{H}(t, \ell)$  pontosan akkor, ha

$$s_1 \geq 3 - \ell, s_2 \geq 5 - \ell, \dots, s_{t-1} \geq 2t - \ell - 1$$

és  $s_t < 2t - \ell + 1$  teljesül. Ezek szerint  $s_t = 2t - \ell$  (a  $t = 1$  csak az  $\ell = 1$  esetben jön szóba). Ha  $t > 1$ , ekkor  $s_{t-1} = 2t - \ell - 1$  is igaz lesz.

Legyen  $J \subseteq [n]$  egy tetszőleges részhalmaz és  $0 \leq i \leq |J|$  egy nemnegatív egész. Ekkor  $\sigma_{J,i}$ -vel jelöljük az  $x_j$ ,  $j \in J$  változók  $i$ -elemi szimmetrikus polinomját:

$$\sigma_{J,i} := \sum_{T \subseteq J, |T|=i} x_T \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n].$$

Most legyen  $0 < \ell \leq t < (n + \ell)/2$ ,  $0 \leq k \leq n$  és  $H \in \mathcal{H}(t, \ell)$ . Vezessük be a  $H' = H \cup \{2t - \ell + 1, 2t - \ell + 2, \dots, n\}$  jelölést.

Értelmezzük az  $f_{H,k}$  polinomot a következő képlettel:

$$f_{H,k} = f_{H,k}(x_1, \dots, x_n) := \sum_{j=0}^t (-1)^{t-j} \binom{k-j}{t-j} \sigma_{H',j}.$$

Megjegyezzük, hogy az  $f_{H,k}$  a  $H$ -n keresztül a  $t$ -től és az  $\ell$ -től is függ. Továbbá a  $H$  egyértelműen meghatározza  $t$ -t és az  $\ell$ -et.

Legyenek  $0 \leq \ell - 1 \leq k \leq n$  tetszőleges egészek. Ekkor értelmezzük a  $D(k, \ell)$  halmazt a következőképp:

$$D(k, \ell) := \{\{g_1 < \dots < g_t\} \subseteq [n] : t \leq k \text{ és } g_j \geq 2j - \ell + 1 \text{ ha } 1 \leq j \leq t\}.$$

R. P. Anstee és Sali Attila után (lásd [2]) azt mondjuk, hogy egy

$$S = \{s_1 < s_2 < \dots < s_d\} \subseteq [n]$$

halmazt rendezés-szétzúz egy  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  halmazrendszer, ha a következők teljesülnek: az  $S = \emptyset$  esetben az  $\mathcal{F}$  család nem üres, míg ha  $|S| > 0$ , akkor találunk  $2^d$  olyan  $\mathcal{F}$ -beli halmazt, amelyet két részcsaládba,  $\mathcal{F}_0$ -ba és  $\mathcal{F}_1$ -be oszthatunk úgy, hogy  $s_d \notin F$  minden  $F \in \mathcal{F}_0$ -ra, míg  $s_d \in F$  minden  $F \in \mathcal{F}_1$ -re, és minden  $F \in \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1$ -re,  $\mathcal{F}_0$  és  $\mathcal{F}_1$  is rendezés-szétzúzza az  $S \setminus \{s_d\}$  halmazt, továbbá  $T \cap F_0 = T \cap F_1$  teljesül a  $T = \{s_d + 1, s_d + 2, \dots, n\}$ -re és minden  $F_0 \in \mathcal{F}_0, F_1 \in \mathcal{F}_1$ -re. Legyen

$$\text{osh}(\mathcal{F}) := \{S \subseteq [n] : \mathcal{F} \text{ rendezés-szétzúzza } S\text{-t}\}.$$

A [2] cikkben R. P. Anstee, Rónyai L. és Sali A. ballot sorozatok segítségével megkapta az  $\binom{[n]}{d}$  teljes uniform család rendezés-szétzúzott halmazait, ahol  $d \leq n/2$ :

$$\text{osh}\left(\binom{[n]}{d}\right) = \{\{s_1 < \dots < s_d\} \subset [n] : j \leq d \text{ és } s_i \geq 2i \text{ minden } 1 \leq i \leq j\text{-re}\}. \quad (1)$$

Nyilvánvaló a definícióból, hogy tetszőleges nem üres  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  családra  $\text{osh}(\mathcal{F}) = \text{osh}(\text{co}(\mathcal{F}))$ , ahol  $\text{co}(\mathcal{F}) = \{[n] \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$ . Speciálisan  $\text{osh}\binom{[n]}{d} = \text{osh}\binom{[n]}{n-d}$ .

A következő Tétel a teljes uniform család rendezés-szétzúzásának a leírását általánosítja teljes  $\ell$ -széles családokra.

**2.1. Tétel** (Thm. 4.6 az értekezésben) Legyen  $0 \leq k < (n + \ell)/2$ . Ekkor

$$\text{osh}(\mathcal{F}^{k,\ell}) = D(k, \ell).$$

(b) Ha  $k \geq (n + \ell)/2$ , ekkor

$$\text{osh}(\mathcal{F}^{k,\ell}) = D(n - k + \ell - 1, \ell).$$

Tekintsük az  $[n]$  részhalmazainak egy tetszőleges  $\mathcal{F}$  családját. Azt mondjuk, hogy  $\mathcal{F}$  szétzúzza  $S$ -t, ha

$$\{E \cap S : E \in \mathcal{F}\} = 2^S. \quad (2)$$

Ekkor definiáljuk az  $\mathcal{F}$  halmazrendszer szétzúzottját,  $\text{sh}(\mathcal{F})$ -t mint

$$\text{sh}(\mathcal{F}) := \{S \subseteq [n] : \mathcal{F} \text{ szétzúzza } S\text{-t}\}. \quad (3)$$

Emlékeztetünk arra, hogy egy  $p$  méretű lánc  $2^{[n]}$ -ben  $[n]$  részhalmazainak egy tetszőleges olyan  $A_1, \dots, A_p$  sorozata, amelyre  $A_1 \subset \dots \subset A_p$ .

Jelölje  $g(n, t, d)$  azon  $2^{[n]}$ -beli halmazrendserek maximális elemszámát, amelyek nem zúznak szét  $t$  elemű halmazt, és nem tartalmaznak egyúttal  $d + 1$  elemű láncot sem. Frankl P. [6]-ben a következőt sejtette:

**2.2. Sejtés** Tegyük fel, hogy  $2t \leq n + d$ . Ekkor

$$g(n, t, d) \leq \sum_{i=\max(0, t-d)}^{t-1} \binom{n}{i}. \quad (4)$$

A következő Tétel ennek a sejtésnek a speciális esete.

**2.3. Tétel** (Thm. 4.1 az értekezésben) Tegyük fel, hogy  $2t \leq n + \ell$  és legyen  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  egy tetszőleges olyan  $\ell$ -széles család, amely nem zúz szét  $t$  elemű halmazt. Ekkor

$$|\mathcal{F}| \leq \sum_{i=\max(0, t-\ell)}^{t-1} \binom{n}{i}.$$

Jelölje  $I(k, \ell) := I(V(\mathcal{F}^{k,\ell}))$  az  $\mathcal{F}^{k,\ell}$  teljes  $\ell$ -széles család karakterisztikus vektorainak az ideálját. Az  $\ell = 1$  speciális esetben  $I(d) := I(d, 1)$  jelöli a teljes  $d$ -uniform családhoz tartozó ideált.

A következő két téTELben leírjuk az  $I(k, \ell)$  ideálok redukált Gröbner bázisait és az  $\text{in}(I(k, \ell))$  kezdőideál minimális generátorrendszerét.

Legyen  $0 < \ell \leq k + 1$ . Jelöljük  $\mathcal{B}(k, \ell)$ -lel az  $[n]$  azon  $U$  részhalmazainak a rendszerét, amelyre  $U = \{u_1 < \dots < u_{k+1}\}$  és  $u_j \geq 2j - \ell + 1$  fennáll minden  $j = 1, \dots, k$ -ra. Az  $\ell = 1$  speciális esetben legyen  $\mathcal{B}(d) := \mathcal{B}(d, 1)$ .

**2.4. Tétel** (*Corollary 3.4 és Corollary 3.5 az értekezésben*) Legyenek  $d$  és  $n$  olyan egészek, amelyekre  $n > 0$  és  $0 \leq d \leq n/2$  teljesül. Legyen  $\mathbb{F}$  egy tetszőleges test és  $\prec$  egy tetszőleges tagrendezés az  $S = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomgyűrű monomjain, amelyre  $x_n \prec \dots \prec x_1$ . Ekkor az alábbi monomhalmaz

$$\cup_{t=1}^d \{x_H : H \in \mathcal{H}(t)\} \cup \{x_U : U \in \mathcal{B}(d)\} \cup \{x_i^2 : i = 2, \dots, n\}$$

az  $\text{in}(I(d)) = \text{in}(I(n-d))$  kezdőideál egy minimális generátorrendszerére. A polinomok alábbi  $\mathcal{G}$  halmaza az  $I(d)$  ideál redukált Gröbner-bázisa:

$$\begin{aligned} & \{x_2^2 - x_2, \dots, x_n^2 - x_n\} \cup \{x_J : J \in \mathcal{B}(d)\} \cup \\ & \{f_{H,d} : H \in \mathcal{H}(t) \text{ valamely } 0 < t \leq d\text{-re}\}. \end{aligned}$$

Hasonlóan, a következő  $\mathcal{G}^*$  halmaz az  $I(n-d)$  ideál redukált Gröbner-bázisa:

$$\begin{aligned} & \{x_2^2 - x_2, \dots, x_n^2 - x_n\} \cup \{x^J : J \in \mathcal{B}(d)\} \cup \\ & \{f_{H,n-d} : H \in \mathcal{H}(t) \text{ valamely } 0 < t \leq d\text{-re}\}. \end{aligned}$$

**2.5. Tétel** (*Corollary 4.3 és Corollary 4.4 az értekezésben*) Legyen  $n > 0$ ,  $k$  és  $\ell$  olyan egészek, amelyekre  $0 < \ell - 1 \leq k \leq n$  teljesül. Legyen  $\mathbb{F}$  egy tetszőleges test és  $\prec$  egy tetszőleges olyan tagrendezés az  $S = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomgyűrű monomjain, amelyre  $x_n \prec \dots \prec x_1$ . Ha  $k < (n + \ell)/2$ , ekkor

$$\begin{aligned} & \{x_i^2 : i = 1, \dots, n\} \cup \{x_U : U \in \mathcal{B}(k, \ell)\} \cup \\ & \{x_H : H \in \mathcal{H}(t, \ell) \text{ valamely } \ell \leq t \leq k\text{-re}\} \end{aligned}$$

az  $\text{in}(I(k, \ell))$  kezdőideál egy minimális generátorrendszerére és az alábbi  $\mathcal{G}$  polinomhalmaz az  $I(k, \ell)$  ideál redukált Gröbner-bázisa a  $\prec$  tagrendezésre nézve:

$$\begin{aligned} & \{x_1^2 - x_1, \dots, x_n^2 - x_n\} \cup \{x_J : J \in \mathcal{B}(k, \ell)\} \cup \\ & \{f_{H,k} : H \in \mathcal{H}(t, \ell) \text{ valamely } \ell \leq t \leq k\text{-re}\}. \end{aligned}$$

A  $k \geq (n + \ell)/2$  esetben

$$\begin{aligned} & \{x_i^2 : i = 1, \dots, n\} \cup \{x_U : U \in \mathcal{B}(n - k + \ell - 1, \ell)\} \cup \\ & \{x_H : H \in \mathcal{H}(t, \ell) \text{ valamely } \ell \leq t \leq n - k + \ell - 1\text{-re}\} \end{aligned}$$

adja az  $\text{in}(I(k, \ell))$  kezdőideál egy minimális generátorrendszerét és a következő halmaz az  $I(k, \ell)$  ideál redukált Gröbner-bázisa a  $\prec$  tagrendezésre nézve:

$$\begin{aligned} & \{x_1^2 - x_1, \dots, x_n^2 - x_n\} \cup \{x^J : J \in \mathcal{B}(n - k + \ell - 1, \ell)\} \cup \\ & \{f_{H,k} : H \in \mathcal{H}(t, \ell) \text{ valamely } \ell \leq t \leq n - k + \ell - 1\text{-re}\}. \end{aligned}$$

Az eredményeink egyszerű alkalmazásaként Frankl P. következő becslésének egy új bizonyítását nyerjük:

Legyen  $p$  egy tetszőleges prím és  $k$  egy tetszőleges egész. Jelölje  $\mathcal{F}(k, p)$  a következő halmazrendszert:

$$\mathcal{F}(k, p) = \{K \subseteq [n] : |K| \equiv k \pmod{p}\}.$$

**2.6. Tétel** (*Corollary 3.10 az értekezésben*) *Ha  $0 \leq \ell \leq p - 1$  és  $2\ell \leq n$ , akkor*

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_p} I(\mathcal{F}(k, p), \binom{[n]}{\leq \ell}) \leq \binom{n}{\ell}.$$

## 2.2. Babai és Frankl egy sejtése

Legyen  $p$  egy tetszőleges prím és  $k$  tetszőleges egész. Legyen  $q = p^\alpha$ ,  $\alpha \geq 1$  a  $p$  egy tetszőleges hatványa. Jelölje  $\mathcal{F}(k, q)$  a következő halmazrendszert:

$$\mathcal{F}(k, q) = \{K \subseteq [n] : |K| \equiv k \pmod{q}\}.$$

A 2.7. Tétel Babai L. és Frankl P. egyik sejtése volt. Az értekezés 5. fejezetében az  $I(V(\mathcal{F}(k, q)))$  ideál Gröbner–bázisaival való redukciós érveléssel bizonyítjuk be ezt a sejtést.

**2.7. Tétel** (*Thm. 5.7 az értekezésben*) *Legyen  $k$  egy tetszőleges egész és  $q = p^\alpha$ ,  $\alpha \geq 1$ , egy tetszőleges prímhatvány. Tegyük fel, hogy  $2(q - 1) \leq n$ . Legyen  $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$  az  $[n]$  részhalmazainak egy olyan rendszere, amelyre teljesül a következő két feltétel:*

$$(a) |A_i| \equiv k \pmod{q} \text{ ha } i = 1, \dots, m$$

és

$$(b) |A_i \cap A_j| \not\equiv k \pmod{q} \text{ ha } 1 \leq i, j \leq m, i \neq j.$$

Ekkor

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{q-1}.$$

A következő eredmény Frankl P. egyik jól ismert rangbecslésének (2.6. Tétel) az általánosítása prímhatványokra.

**2.8. Tétel** (*Thm. 5.9 az értekezésben*) *Legyen  $p$  egy tetszőleges prím és  $k$  egy tetszőleges egész. Legyen  $q = p^\alpha$ ,  $\alpha \geq 1$ . Ha  $\ell \leq q - 1$  és  $2\ell \leq n$ , ekkor*

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_p} I(\mathcal{F}(k, q), \binom{[n]}{\leq \ell}) \leq \binom{n}{\ell}.$$

Ezt a Tételt az  $I(V(\mathcal{F}(k, q)))$  ideál deglex standard monomjainak a vizsgálataval bizonyítottuk be.

### 2.3. A permutációk Gröbner–bázisa és standard monomjai

A 6. fejezetben a permutációk redukált Gröbner–bázisát és standard monomjait adjuk meg tetszőleges  $\prec$  tagrendezésre nézve.

Jelölje  $S_n$  an  $[n]$ -en ható szimmetrikus csoportot. Legyen  $\mathbb{F}$  egy rögzített, de egyébként tetszőleges test. Válasszunk  $n$  különböző elemet az  $\mathbb{F}$  testből, legyenek ezek  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Ekkor jelölje

$$V_{(1^n)} := V_{(1^n)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := \{(\alpha_{\pi(1)}, \dots, \alpha_{\pi(n)}) : \pi \in S_n\}$$

az  $\alpha_i$  elemek összes permutációinak a halmazát, amelyet mint  $\mathbb{F}^n$  egy részhalmazát tekintjük.

Legyen  $i$  egy tetszőleges nemnegatív egész és jelölje

$$h_i(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\substack{a_1 + \dots + a_n = i \\ a_1 \geq 0, \dots, a_n \geq 0}} x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}$$

az  $i$ . teljes szimmetrikus polinomot. Ha  $0 \leq i \leq n$ , ekkor  $\sigma_i$ -vel jelöljük az  $i$ . elemi szimmetrikus polinomot:

$$\sigma_i(x_1, \dots, x_n) = \sum_{S \subset [n], |S|=i} x_S.$$

Az  $1 \leq k \leq n$  egészekre értelmezzük az  $f_k \in S$  polinomokat a következőképpen:

$$f_k := \sum_{i=0}^k (-1)^i h_{k-i}(x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \sigma_i(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Megjegyezzük, hogy  $f_k \in \mathbb{F}[x_k, x_{k+1}, \dots, x_n]$ . Továbbá  $\deg f_k = k$  és az  $f_k$  főmonomja  $x_k^k$  minden olyan  $\prec$  tagrendezésre, amelyre  $x_n \prec x_{n-1} \prec \dots \prec x_1$ .

**2.9. Tétel (Thm. 6.2 az értekezésben)** Legyen  $\mathbb{F}$  egy tetszőleges test és  $\prec$  egy tetszőleges olyan tagrendezés az  $S = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$  polinomgyűrű monomjain, amelyre  $x_n \prec \dots \prec x_1$ . Ekkor az  $I(V_{(1^n)})$  ideál redukált Gröbner–bázisa

$$\{f_i : 1 \leq i \leq n\}.$$

Továbbá a standard monomok halmaza:

$$\text{Sm}(\prec, I(V_{(1^n)})) = \{x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} : 0 \leq \alpha_i \leq i-1 \text{ minden } 1 \leq i \leq n\text{-re}\}. \quad (5)$$

Ennek a Tételnek egyik egyszerű alkalmazása a szimmetrikus polinomok alaptételének a következő általánosítása, amelyet Garsia adott meg először a [8] dolgozatban.

**2.10. Tétel** minden  $f \in \mathbb{F}[y_1, \dots, y_n]$  polinomot egyértelműen felírhatunk a következő alakban:

$$f(y_1, \dots, y_n) = \sum_{w \in \mathcal{N}} \sum_{p \geq 0} a_{w,p} w \sigma_1^{p_1} \sigma_2^{p_2} \cdots \sigma_n^{p_n},$$

ahol  $a_{w,p} \in \mathbb{F}$  és  $\mathcal{N} = \{y_1^{\alpha_1} \cdots y_n^{\alpha_n} : 0 \leq \alpha_i \leq i-1 \text{ minden } 1 \leq i \leq n\text{-re}\}$  az Artin-monomok halmaza.

## 2.4. A partíciók standard monomjai

A 7. fejezetben kombinatorikai leírást adunk az  $I(V_\lambda)$  ideál lexikografikus standard monomjaira, valamint a Hilbert függvényére (lásd  $V_\lambda$  definícióját lent). Alkalmazásként megadjuk az  $S^\lambda$  Specht modulus (James skalárszorzatra vonatkozó)  $(S^\lambda)^\perp$  ortogonális kiegészítőjének egy bázisát.

Először megadunk néhány definíciót a téma körben.

Természetes számoknak egy  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$  sorozatát az  $n$  egy partíciójának nevezünk, ha  $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k = n$  és  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k > 0$ . Ha  $\lambda$  az  $n$  egy partíciója, akkor ezt  $\lambda \vdash n$  jelöli.

Legyen  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$  az  $n$  egy rögzített partíciója. A  $\lambda$  Ferrers diagramja egy  $n$  négyzetet tartalmazó mátrix, aminek  $k$  balra igazított sora van, és minden sora  $\lambda_i$  négyzetet tartalmaz, ahol  $1 \leq i \leq k$ . Egy  $t$   $\lambda$ -tablót úgy kapunk a  $\lambda$ -hoz tartozó Ferrers diagramból, hogy tetszőleges módon kitölthük ezt a diagramot  $1, 2, \dots, n$ -nel bijektíven.

Például, ha  $n = 7$ ,  $\lambda = (4, 2, 1)$ , ekkor

2	5	3	6
4	1		
7			

és

1	2	4	5
3	7		
6			

(6)

kettő a  $7!$   $\lambda$ -tabló közül.

Azt mondjuk, hogy  $t$  egy standard  $\lambda$ -tabló, ha minden sorában és oszlopában a számok szigorúan monoton nőnek.

Legyen  $\alpha_0, \dots, \alpha_{k-1}$  az  $\mathbb{F}$  test  $k$  különböző eleme és  $\lambda \vdash n$  egy tetszőleges partíció. Jelöljük  $V_\lambda$ -val az összes olyan  $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{F}^n$  vektor halmazát, amelyre

$$|\{j \in [n] : v_j = \alpha_i\}| = \lambda_{i+1}$$

teljesül minden  $0 \leq i \leq k-1$ -re.

A  $V_\lambda$  véges ponthalmaz standard monomjainak a leírásához először egy  $\leq$  részbenrendezést definiálunk  $\mathbb{N}^n$ -en: ha  $u = (u_1, \dots, u_n)$  és  $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{N}^n$  tetszőleges két vektor, akkor  $u \leq v$  pontosan akkor teljesül, ha  $u_i \leq v_i$  minden  $1 \leq i \leq n$ -re.

Egy  $W \subseteq \mathbb{N}^n$  részhalmaz lefelé zárt burkát a következőképp értelmezzük:

$$W^\leq := \{w \in \mathbb{N}^n : \text{ létezik egy olyan } v \in W, \text{ amelyre } w \leq v\}.$$

Egy *ballot sorozat*, vagy *rácsszó* nemnegatív egészeknek egy olyan  $m = (i_1, i_2, \dots, i_n)$  vektora, amelynek bármely  $m_k = (i_1, \dots, i_k)$  kezdőszeletére és bármely  $l$  nemnegatív egészre, az  $m_k$ -ban legalább annyi  $l$  szerepel, mint  $l+1$ .

Jól ismert (lásd [16]), hogy a rácsszavak bijekcióban állnak a standard tablókkal. Ha adott egy  $t$  standard tabló, amelyet kitöltöttünk  $n$  elemmel, akkor képezzük az  $m_k = (i_1, \dots, i_k)$  sorozatot, ahol  $i_k = i-1$  pontosan akkor, ha  $k$ -t a  $t$  tabló  $i$ . sorába írtuk be. Ezen a módon  $t$ -hez hozzárendeltük az  $m$  rácsszót. Az inverz leképezést is könnyű megkonstruálni.

Azt mondjuk, hogy egy rácsszó  $\lambda$  típusú, ha a rácsszónak megfelelő  $t$  tabló egy standard  $\lambda$ -tabló. Ekkor  $\lambda \vdash n$ -re értelmezzük  $\text{st}(\lambda)$ -t:

$$\text{st}(\lambda) := \{u \in \mathbb{N}^n : u \text{ egy } \lambda \text{ típusú rácsszó}\}.$$

Jelölje  $b_\lambda := \text{st}(\lambda)^\leq$ -t és legyen  $B_\lambda = \{x^u : u \in b_\lambda\}$ . Nyilván  $b_\lambda \subseteq \mathbb{N}^n$  lefelé zárt részhalmaz.

A következő Tételt már ismertük a  $\lambda = (n-d, d)$  és a  $\lambda = (1^n)$  speciális esetekben. Az előbbi esetben  $d \leq n/2$  biztosan teljesül és egyszerűen be lehet bizonyítani, hogy  $B_\lambda$  azokból az  $x_{i_1}x_{i_2} \dots x_{i_j}$  négyzetmentes monomokból áll, ahol  $j \leq d$ ,  $i_1 < i_2 < \dots < i_j$  és  $i_\ell \geq 2\ell$  minden  $1 \leq \ell \leq j$ -re.

A [2] cikkben R. P. Anstee, Rónyai L. és Sali A. belátta, hogy

$$\text{Sm}(\prec_{lex}, I(V_\lambda)) = B_\lambda.$$

A [11] cikkünkben ezt az eredményt általánosítottuk tetszőleges olyan  $\prec$  tagrendezésre, amelyre  $x_n \prec \dots \prec x_1$ .

Legyen  $\prec$  egy tetszőleges ilyen tagrendezés, és legyen  $\lambda = (1^n)$ . Ebben az esetben [10] 2.2 Tételében beláttuk, hogy

$$\text{Sm}(\prec, I(V_\lambda)) = \{x_1^{\beta_1} \dots x_n^{\beta_n} : 0 \leq \beta_i \leq i-1 \text{ minden } 1 \leq i \leq n\text{-re}\}. \quad (7)$$

Nyilván  $g = (0, 1, \dots, n-1)$  az egyetlen  $\lambda = (1^n)$  típusú rácsszó, tehát  $\text{st}(\lambda) = \{g\}$  teljesül. Ekkor (7) szerint  $\text{Sm}(\prec, I(V_\lambda)) = B_\lambda$  most is igaz.

Az értekezés 7. fejezetének a fő eredménye a következő:

**2.11. Tétel** (*Thm. 7.8, Thm. 7.12 és Corollary 7.13 az értekezésben*)  
Legyen  $\mathbb{F}$  egy tetszőleges test és  $\lambda$  az  $n$  egy tetszőleges partíciója. Ekkor

$$\text{Sm}(\prec_{lex}, I(V_\lambda)) = B_\lambda.$$

Továbbá

$$h_{I(V_\lambda)}(m) = |B_\lambda \cap \text{Mon}(n, \leq m)|,$$

ha  $m \geq 0$ .

A. M. Garsia és C. Procesi a q-Kostka polinomokat vizsgálva bebizonyították, hogy az  $\text{Sm}(\prec_{deg}, V_\lambda) = B_\lambda$  egyenlőség is fennáll minden  $\lambda$  particióra (Proposition 3.2 [9]-ben). Ők a racionális számtest felett dolgoztak, de a bizonyítások érvényben maradnak tetszőleges test felett. Egyúttal a  $\text{gr } S/I(V_\lambda)$  asszociált fokszámoszott gyűrűt is leírták.

A 2.11. Tételből egy új, talán egyszerűbb bizonyítást kaphatunk Garsianak és Procesinek a  $V_\lambda$  deglex standard monomjairól szóló eredményére. Ezáltal elkerülhetjük a Tanisaki–ideálok használatát (lásd (1.5) [9]-ben). A 2.11. Tételt úgy is tekinthetjük, mint Garsia és Procesi eredményének a kiterjesztését a lexikografikus esetre.

## Hivatkozások

- [1] W. W. Adams, P. Loustaunau, *An Introduction to Gröbner Bases*, American Mathematical Society, 1994.
- [2] R.P. Anstee, L. Rónyai, A. Sali, Shattering news, *Graphs and Combinatorics* **18** (2002), 59–73.
- [3] A. Bernasconi, L. Egidi, Hilbert function and complexity lower bounds for symmetric Boolean functions, *Information and Computation* **153**(1999), 1–25.
- [4] L. Babai, P. Frankl, *Linear algebra methods in combinatorics*, September 1992.
- [5] D. Cox, J. Little, D. O’Shea, *Ideals, varieties, and algorithms*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [6] P. Frankl, Intersection theorems and mod  $p$  rank of inclusion matrices, *J. Combin. Theory A* **54** (1990), 85–94.
- [7] K. Friedl, L. Rónyai, Order-shattering and Wilson’s theorem, *Discrete Mathematics*, **270** (2003), 127–136..
- [8] A. M. Garsia, Pebbles and expansions in the polynomial ring, *Polynomial identities and combinatorial methods (Pantelleria 2001)*, 261–285, Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 235, Dekker, New York, 2003.
- [9] A. M. Garsia, C. Procesi, On certain graded  $S_n$ -modules and the q-Kostka polynomials, *Advances in Mathematics*, **94** (1992), 82–138

- [10] G. Hegedűs, A. Nagy, L. Rónyai, Gröbner bases for permutations and oriented trees, *Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp.* 23 (2004), 137–148.
- [11] G. Hegedűs, L. Rónyai, Gröbner bases for complete uniform families, *J. of Algebraic Combinatorics* 17 (2003), 171–180.
- [12] G. Hegedűs, L. Rónyai, Standard monomials for  $q$ -uniform families and a conjecture of Babai and Frankl, *Central European Journal of Mathematics* 1 (2003), 198 - 207.
- [13] G. Hegedűs, L. Rónyai, Gröbner bases for complete  $\ell$ -wide families, manuscript
- [14] G. Hegedűs, L. Rónyai, Standard monomials for partitions, submitted to the Acta Math. Hung.
- [15] G. D. James, *The Representation Theory of the Symmetric Groups*, Springer Lecture Notes in Mathematics 682, Springer-Verlag, 1978.
- [16] B. E. Sagan, *The symmetric group, representations, combinatorial algorithms, and symmetric functions*, GTM 203, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2001.
- [17] R. Smolensky, On representations by low-degree polynomials, *Proc. of the 34th IEEE Symposium on the Foundations of Computer Science*, 1993, pp. 130–138.